

SEDATIF PC®

Bukkális tabletta

Homeopátiás gyógyszerkészítmény

Növényi eredetű anyagok felhasználásával készült szopogatóra szánt tabletta.

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót.

- E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múlt panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő, szakszerű alkalmazása.
- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészehez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei nem enyhülnek vagy éppen súlyosbodnak.

1. MILYEN HATÓANYAGOT ÉS SEGÉDANYAGOT TARTALMAZ A SEDATIF PC TABLETTA?

Összetétel:

1 tabletta hatóanyagtartalma:

Aconitum napellus.... C 6 ..0,50 mg
Atropa belladonna C 6 ..0,50 mg
Calendula officinalis.. C 6 ..0,50 mg
Chelidonium majus .. C 6 ..0,50 mg
Abrus precatorius..... C 6 ..0,50 mg
Viburnum opulus..... C 6 ..0,50 mg

Segédanyagok: magnézium-sztearát, laktóz-monohidrát (72 mg), szacharóz (225 mg).

2. MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ A SEDATIF PC TABLETTA?

A szervezet öngyógyító törekvésének serkentése szorongás, érzelmi labilitás, ingerlékenység, valamint alvászavarok esetén, különösen túlhajszolt egyének, hiperaktív gyerekek és idős betegek esetében.

3. HOGYAN FEJTI KI HATÁSÁT A SEDATIF PC TABLETTA?

A homeopátiás gyógyszerek a szervezet öngyógyító törekvésének serkentésére hatnak. Az egyes

hatóanyagok homeopátiás alkalmazása a következő panaszok gyógyulását segítik elő:

Aconitum napellus: szorongással járó általános túlfűtöttség, izgatottság, álmatlanság csökkentésére.

Atropa belladonna: a túlzott mértékű érzékszervi érzékenység (fény, zaj, hideg) csökkentésére; lüktető, erős fejfájásra.

Calendula officinalis: enyhe görcsoldó hatású.

Chelidonium majus: hatóanyaga a chelidonsav, mely nyugtató hatású.

Abrus precatorius: „túlhajszolt” egyén fejfájására.

Viburnum opulus: idegnyugtató és simaizom relaxáló hatással rendelkezik.

4. MILYEN ADAGBAN ÉS MILYEN GYAKRAN HASZNÁLJA A SEDATIF PC TABLETTÁT?

Adagolás és alkalmazás

Adagolás:

Ha az orvos másképp nem rendel szokásos adagja felnőtteknek naponta 3-szor 2 tabletta, gyermekeknek 14 éves kor alatt 4-szer 1 tabletta. Az adag szükség esetén fél óra elteltével megismételhető. A tünetek enyhülésekor az alkalmazás gyakorisága csökkenthető. Alvászavar esetén a napi adagot be kell venni és az utolsó adagot (2 tablettát) este, közvetlenül lefekvés előtt kell elszopogatni.

Az alkalmazás módja:

A tablettákat étkezés előtt fél órával kell lassan a szájban elszopogatni vagy fél pohár vízben feloldva kell meginni. Amennyiben a panaszok a kezelés ellenére tartósan (egy héten túl is) fennállnak, javulás nem következik be forduljon kezelőorvoshoz vagy gyógyszerészhez.

5. MIRE KELL FIGYELNI A SEDATIF PC TABLETTA SZEDÉSEKOR?

A homeopátiás kezelés kezdetén jellemző a panaszok átmeneti erősödése. Nem várt tünetek jelentkezéséről tájékoztassa kezelőorvosát! A már szedett gyógyszereit csak orvosával való konzultálás után változtathatja meg, ill. csökkentheti azok dózisait. *Laktózérzékenyek* vegyék figyelembe, hogy a Sedatif PC készítmény tablettánként 72 mg tejcukrot tartalmaz! *Cukorbetegség* esetén figyelembe kell venni, hogy a Sedatif PC készítmény tablettánként 225 mg szacharózt tartalmaz.

6. MIKOR NEM SZABAD A SEDATIF PC TABLETTÁT ALKALMAZNI?

A gyógyszer bármelyik összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén nem alkalmazható, és szedését azonnal abba kell hagyni, ha a terápia közben jelentkeznek a túlérzékenységi tünetek.

7. HOGYAN BEFOLYÁSOLJA MÁS GYÓGYSZEREK HATÁSÁT?

Más gyógyszerekkel való kölcsönhatás eddig nem ismert.

8. MILYEN MÁS SZEREK BEFOLYÁSOLJÁK A SEDATIF PC TABLETTA HATÁSÁT?

A homeopátiás gyógyszer alkalmazásával egyidőben (+/- fél óra) tilos illóolajat is tartalmazó (mentolos, eukaliptuszos) cukorkát szopogatni, és nem szabad intenzív illatú fogkrémet használni. A kezelés ideje alatt aromás anyagokat tartalmazó kenőcsöt (pl. kámforos) sem szabad alkalmazni, mivel ezek jelentős mértékben képesek befolyásolni a homeopátiás gyógyszer hatását.

9. MILYEN NEM KÍVÁNT MELLÉKHATÁSOK LÉPHETNEK FEL A SEDATIF PC TABLETTA SZEDÉSE KÖZBEN?

A Sedatif PC tabletták alkalmazásával kapcsolatban eddig mellékhatást nem jelentettek. Hosszabb ideig tartó, indokolatlan szedése (javallat nélküli alkalmazása) esetén nem kívánt hatások (*ún. gyógyszer-vizsgálati tünetek*) léphetnek fel.

Ezekről a panaszokról, ill. minden nem várt tünetről tájékoztassa orvosát vagy gyógyszerészét!

10. OKOZ-E GYÓGYSZERFÜGGŐSÉGET/ HOZZÁSZOKÁST?

Gyógyszerfüggőséget, hozzá szokást eddig nem észleltek.

11. A KÉSZÍTMÉNY HATÁSA A GÉPJÁRMŰVEZETÉSHEZ ÉS GÉPEK ÜZEMELTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEKRE

A Sedatif PC bukkális tabletták nem befolyásolják az éberségi állapotot és/vagy a koncentráció-képességet, ezért gépjárművezetők, gépjárművezetők egyaránt alkalmazhatják.

12. ADHATÓ-E A SEDATIF PC TABLETTA GYERMEKEKNEK?

Csecsemőknek a félrenyelés veszélye miatt nem adható! Hiperaktív kisgyermekeknek, akik a tablettát biztonsággal el tudják szopogatni, adása javallott.

13. ALKALMAZHATÓ-E A SEDATIF PC TABLETTA TERHESSÉG ÉS SZOPTATÁS IDEJE ALATT?

Terhesség és szoptatás időszakában való alkalmazásával kapcsolatban kockázatokról eddig nem jelentettek adatokat.

14. HOGYAN KELL TÁROLNI A SEDATIF PC TABLETTÁT?

Szobahőmérsékleten, 25 °C alatt. Célszerű az eredeti külső csomagolásban tárolni, fénytől, közvetlen napsugárzástól és erős elektromágneses hatásoktól védve. A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó. A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:
Laboratoires BOIRON
20, rue de la Libération
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon,
France

OGYI-HG - 106/01

**Betegtájékoztató OGYI-eng.
száma: 15.612/75/2003**